

**SETOR DE ENDOSCOPIA – ECOENDOSCOPIA ALTA  
ORIENTAÇÕES PARA O DIA DO EXAME**

**Data do exame:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Horário:** \_\_\_\_\_ Chegar 20 minutos antes.

**Estar em Jejum de 10 horas inclusive de água.**

É obrigatório vir acompanhando de pessoa entre 18 anos e 65 anos (em condições de auxiliar o paciente) onde a mesma deverá permanecer aguardando durante todo o procedimento, caso contrário, o exame não poderá ser realizado.

Trazer pedido médico **original**, carteirinha do convênio e RG. **Trazer exames anteriores referente ao procedimento a ser realizado.**

Após o exame o paciente não poderá dirigir e nem estar de moto.

Em caso de amamentação, não amamentar por 24 horas após o exame.

Não realizar exames laboratoriais na mesma data. Não usar esmalte de cor escura no dia do exame.

Pacientes que irão realizar **Endoscopia com ligadura ou Endoscopia com dilatação** é necessário que tragam exames de Hemograma e Coagulograma.

**Paciente com Hipertensão:** deverá trazer: Eletrocardiograma e Ecocardiograma ou somente a Avaliação do cardiologista

**Pacientes a partir de 65 anos ou com problemas cardíacos ou que tenha algum problema de saúde é necessário trazer os exames abaixo. (NA AUSÊNCIA DOS EXAMES, NÃO SERÁ REALIZADO O PROCEDIMENTO)**

**Eletrocardiograma** (Validade de 3 meses)

**Ecocardiograma** (Validade de 1 ano)

**Hemograma Completo** (Validade 3 meses)

**Coagulograma** – Este exame deve trazer somente se fizer uso de medicamento anticoagulante, O coagulograma deverá ser realizado na mesma semana que irá realizar o procedimento.

**Avaliação do Cardiologista** (Validade 06 meses) - **Avaliação do Pneumologista** - Em caso de Asma, Bronquite e Apneia (Validade 3 meses) - **Técnico do Marcapasso** – Se utilizar marcapasso o técnico deverá acompanhar no horário do exame. Paciente que faz o contato com o técnico para agendar para o mesmo comparecer no dia exame para fazer a reprogramação, isto só acontecerá se for necessário o uso de bisturi elétrico

**Medicações SAXENDA / VICTOZA suspender uso por 72h (3 dias) antes do exame**

**Medicações OZEMPIC / TRULICITY suspender uso por 10 dias antes do exame**

Ambos casos na véspera do exame: DIETA leve, líquida e Coada (24h)

**Medicações: ANTICOAGULANTES (AAS, ASPIRINA, SOMALGIN entre outros)**, converse com seu médico cardiologista ou médico que pediu o exame para que o mesmo seja suspenso, nosso serviço preconiza suspensão por 7 (sete) dias antes da realização do exame.

**Pacientes com acalasia, megaesôfago e doença de chagas** devem seguir a seguinte dieta: Dieta líquida batida no liquidificador durante 4 dias que antecedem o exame, além do jejum de 12 horas antes do exame.